

EXEMPLE D'OUTIL: SUIVI DE TRAITEMENT

Liste des médicaments actuels

Changements survenus depuis le début du traitement

Maîtrise des symptômes du TDAH

○ -3 ○ -2 ○ -1 ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3
 Aucun Changement Mieux

Tolérance de la médication

○ -2 ○ -2 ○ -1 ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3
 Aucun Changement Mieux

Qualité de vie

○ -3 ○ -2 ○ -1 ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3
 Aucun Changement Mieux

Qualification de l'ensemble des changements survenus depuis le début du traitement

- Non-Applicable (aucune prise de médicament) Nette amélioration Faible amélioration
 Aucun Changement Faible détérioration Nette détérioration

Veillez indiquer par un X la fréquence des effets secondaires survenus depuis le dernier rendez-vous médical. Veillez contacter votre médecin si les effets secondaires sont significatifs.

FRÉQUENCE	EFFETS SECONDAIRES																											
	Perte d'appétit	Perte de poids	Gain de poids	Maux d'estomac	Nausée	Vomissements	Diarrhée	Sécheresse (peau / yeux / bouche)	Soif	Maux de gorge	Difficultés à dormir	Tics	Mal de tête	Tensions musculaires	Fatigue	Vertiges	Transpiration	Agitation / excitation	Irritabilité	Changement d'humeur	Trop focuser "Effet Zombie"	Tristesse	Palpitation cardiaques	Changements significatifs de la pression artérielle (+ élevée ou + faible)	Urine fréquemment	Dysfonction sexuelle	Se sent pire ou différemment lorsque la médication s'estompe	
Toujours																												
Souvent																												
À l'occasion																												
Jamais																												

Adapté avec la permission de CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance : Lignes directrices canadiennes pour le TDAH, édition 4.1, Toronto (Ontario); CADDRA 2020.